

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

Окружно такмичење из математике
ученика основних школа
19.03.2016.

VIII разред

1. У координатној равни xOy дата је права $4x + 3y = n$, $n > 0$, која је од координатног почетка O удаљена 12. Одреди површину троугла коју та права заклапа са координатним осама Ox и Oy .
2. Основна ивица правилне четворостране пирамиде је 4cm, а растојање средишта основе од једне бочне стране је $\frac{\sqrt{15}}{2}$ cm. Израчунај запремину те пирамиде.
3. Кружница $c(O_1, r_1)$ додирује изнутра кружницу $k(O, r)$ у тачки A и при томе је $r > 2r_1$. Полуправа са почетном тачком O додирује кружницу c у тачки C и сече кружницу k у тачки B . Одреди величину угла BAC .
4. Одреди све целе бројеве x за које је број $\sqrt{\frac{x+25}{x-5}}$ квадрат неког природног броја.
5. У свако поље таблице 3×3 уписан је један број. Производ бројева у свакој врсти и свакој колони је 1, а производ бројева у сваком квадрату 2×2 је 2. Који број је уписан у централно поље?


Сваки задатак се бодује са по 20 бодова.
Израда задатака траје 150 минута.
Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

VIII РАЗРЕД

Признавати сваки тачан поступак који се разликује од кључа.
Бодовање прилагодити конкретном начину решавања.

1. (МЛ 50/3) Нека права $4x + 3y = n$ сече осе Ox и Oy у тачкама A и B редом. Тада је $A\left(\frac{n}{4}, 0\right)$ и $B\left(0, \frac{n}{3}\right)$, па је $OA = \frac{n}{4}$ и $OB = \frac{n}{3}$ [4 поена]. Хипотенузу AB израчунавамо применом Питагорине теореме на правоугли троугао OAB : $AB^2 = OA^2 + OB^2 = \left(\frac{n}{4}\right)^2 + \left(\frac{n}{3}\right)^2$, одакле је $AB = \frac{5n}{12}$ [4 поена]. Висина која одговара хипотенузи је 12, па је површина троугла OAB : $P = \frac{1}{2} \cdot \frac{5n}{12} \cdot 12 = \frac{5n}{2}$ [4 поена]. С друге стране је $P = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{n^2}{24}$. Сада је $\frac{5n}{2} = \frac{n^2}{24}$ [4 поена], па имамо $n = 60$ и $P = 150$ [4 поена].

2. Нека је S' средиште основе пирамиде $ABCD$ и M подножје висине из S' на страну BCS . Тачка M припада апотеми NS стране BCS . Не тражи се доказ! Слика обавезна (5 поена). Троугао $SS'N$ је правоугли, висина која одговара хипотенузи је $S'M = \frac{\sqrt{15}}{2}$ cm, катета $S'N = 2$ cm.




Из троугла $S'NM$ је $MN^2 = 2^2 - \left(\frac{\sqrt{15}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, $MN = \frac{1}{2}$ cm (3 поена).

Из троугла $S'NS$ је $\left(\frac{\sqrt{15}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot MS$, па је $MS = \frac{15}{2}$ cm (5 поена).

Даље је из троугла $S'SN$: $(SS')^2 = 8^2 - 2^2 = 60$, $SS' = 2\sqrt{15}$ cm (3 поена).

Запремина пирамиде је $V = \frac{32\sqrt{15}}{3}$ cm³ (4 поена).

3. Нека је $\angle BOA = a$, $\angle BAC = x$, $\angle CAO = y$. Троугао OAB је једнакокрак ($OA = OB$), па је $\angle OBA = x + y$. Из троугла OBA је $a + 2x + 2y = 180^\circ$ (*) [5 поена]. Нека је D други пресек праве OA са кружницом c . Тада је $\angle ACD$ прав. Поред тога је $\angle OCD = \angle OAC$ (периферисјки угао над тетивом CD једнак је углу између тетиве CD и тангенте у тачки C), па из троугла OAC имамо да је $a + 2y = 90^\circ$ (**)[10 поена]. Из (*) и (**) следи да је $2x = 90^\circ$, тј. $x = 45^\circ$ [5 поена].



4. Како је $\sqrt{\frac{x+25}{x-5}} = \sqrt{\frac{x-5+30}{x-5}} = \sqrt{1+\frac{30}{x-5}}$, број под кореном би могао бити природан само ако $(x-5) \mid 30$ [5 поена], то јест за $x-5 \in \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$, односно $x \in \{6, 7, 8, 10, 11, 15, 20, 35\}$ [5 поена]. Провером се утврђује да је једино за $x = 7$ број $\sqrt{\frac{x+25}{x-5}}$ једнак квадрату природног

броја $2 \left[\sqrt{\frac{7+25}{7-5}} = 4 = 2^2 \right]$ [10 поена].

5. Нека су бројеви уписани као у следећој табlici.

a	b	c
d	x	e
f	g	h

Из услова задатка је $abcdefghx = (abc) \cdot (dxe) \cdot (fgh) = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$ [5 поена] и $(abdx) \cdot (bcxe) \cdot (dxfg) \cdot (xegh) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ [5 поена]. Такође је $(abdx) \cdot (bcxe) \cdot (dxfg) \cdot (xegh) = (abcdefghx) \cdot (bxg) \cdot (dxe) \cdot x = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot x$, одакле је $x = 16$ [10 поена].

Напомена: Може се показати да квадрат са наведеним особинама заиста постоји, али то се не тражи у задатку.